

KDY NEVODIT DÍTĚ DO ŠKOLKY

HOREČKA



TEPLOTA 37,5 °C
A VYŠŠÍ.
DOPŘEJTE
DÍTĚTI KLID
DOMA.

RÝMA A KAŠEL



SILNÁ RÝMA,
KAŠEL NEBO
ZVÝŠENÁ
TVORBA HLENU
MOHOU BÝT
ZNÁMKOU
INFEKCE.

ZVRACENÍ



PŘI ZVRACENÍ
ZŮSTANE DÍTĚ
DOMA
MINIMÁLNĚ 24
HODIN PO
POSLEDNÍ
EPIZODĚ.

PRŮJEM



ŘÍDKÁ STOLICE
NEBO BOLESTI
BŘÍŠKA MOHOU
BÝT ZNÁMKOU
INFEKČNÍHO
ONEMOCNĚNÍ.

ZÁNĚT SPOJIVEK



ZARUDLÉ, SLZÍCÍ
A HNISAJÍCÍ OČI
MOHOU BÝT
INFEKČNÍ.

VŠÍ



PŘI VÝSKYTU
VŠÍ JE NUTNÉ
ZAHÁJIT
ODVŠIVENÍ A
INFORMOVAT
ŠKOLKU.

ROUPI



SILNÉ SVĚDĚNÍ
V OBLASTI
ZADEČKU MŮŽE
BÝT ZNÁMKOU
PARAZITŮ.

PLANÉ NEŠTOVICE



VYSOCE
NAKAŽLIVÁ
NEMOC. DÍTĚ
MŮŽE ZPĚT DO
ŠKOLKY AŽ PO
ZAHOJENÍ VŠECH
PUCHÝŘKŮ.

SPÁLA



ANGÍNA SE
SPÁLOVOU
VYRÁŽKOU JE
INFEKČNÍ.

IMPETIGO



VYSOCE
INFEKČNÍ KOŽNÍ
ONEMOCNĚNÍ,
KTERÉ
VYŽADUJE
SPECIÁLNÍ
LÉČBU.

PO OČKOVÁNÍ



PŘI ZVÝŠENÉ
TEPLOTĚ,
BOLESTI NEBO
NEOBVYKLÉ
REAKCI JE
LEPŠÍ NECHAT
DÍTĚ DOMA.

MALÁTNOST



POKUD JE DÍTĚ
VÝRAZNĚ
UNAVENÉ,
APATICKÉ NEBO
SE NECÍTÍ DOBRĚ,
DOPŘEJTE MU
ODPOČINEK
DOMA.



POKUD SI NEJSTE JISTÍ, ZDA JE DÍTĚ
ZDRAVÉ, DOPŘEJTE MU KLID DOMA!

V PŘÍPADĚ NEJISTOTY SE PORAĎTE SE
SVÝM PEDIATREM.



NEMOCNÉ DÍTĚ POTŘEBUJE KLID A PÉČI.



CHRAŇME ZDRAVÍ OSTATNÍCH DĚTÍ A DOSPĚLÝCH.



DĚKUJEME ZA OHLEDUPNOST A SPOLUPRÁCI!