

KEDY NEVODIŤ DIEŤA DO MATERSKEJ ŠKOLY

ZVÝŠENÁ TEPLOTA



TEPLOTA 37,5 °C
A VYŠŠIA.
DOPRAJTE
DIEŤAŤU POKOJ
DOMA.

NÁDCHA A KAŠEĽ



SILNÁ NÁDCHA,
KAŠEĽ ALEBO
ZVÝŠENÁ
TVORBA HLIENU
MÔŽU BYŤ
PRÍZNAKOM
INFEKCIE.

VRACANIE



PO VRACANÍ
NECHAJTE DIEŤA
DOMA
MINIMÁLNE 24
HODÍN OD
POSLEDNEJ
EPIZÓDY.

HNAČKA



RIEDKA STOLICA
ALEBO BOLESTI
BRUŠKA MÔŽU
BYŤ PRÍZNAKOM
INFEKČNÉHO
OCHORENIA.

ZÁPAL SPOJIVIEK



ZAČERVENANÉ,
SLZIACE ALEBO
HNISAJÚCE OČI
MÔŽU BYŤ
INFEKČNÉ.

VŠI



PRI VÝSKYTE
VŠÍ
ODPORÚČAME
ZAČAŤ S
ODVŠIVENÍM A
INFORMOVAŤ
MATERSKÚ
ŠKOLU.

MRLE



SILNÉ SVRBNIE
V OBLASTI
ZADOČKA MÔŽE
BYŤ PRÍZNAKOM
PARAZITOV.

OVČIE KIAHNE



VYSOKO NÁKAZLIVÉ
OCHORENIE. DIEŤA
SA MÔŽE VRÁTIŤ DO
MATERSKEJ ŠKOLY
AŽ PO ZAHOJENÍ
VŠETKÝCH
PLUŽGIERIKOV.

ŠARLACH



ANGÍNA SO
ŠARLACHOVOU
VYRÁŽKOU JE
INFEKČNÁ.

IMPETIGO



VYSOKO
INFEKČNÉ
KOŽNÉ
OCHORENIE,
KTORÉ SI
VYŽADUJE
LIEČBU.

PO OČKOVANÍ



PRI ZVÝŠENEJ
TEPLOTE,
BOLESTI ALEBO
NEZVYČAJNEJ
REAKCII JE
LEPŠIE NECHAŤ
DIEŤA DOMA.

MALÁTNOSŤ



AK JE DIEŤA
VÝRAZNE
UNAVENÉ,
APATICKÉ ALEBO
SA NECÍTI DOBRE,
DOPRAJTE MU
ODDYCH DOMA.



AK SI NIE STE ISTÍ, ČI JE DIEŤA
ZDRAVÉ, DOPRAJTE MU POKOJ DOMA!

V PRÍPADE NEISTOTY SA PORAĎTE SO
SVOJÍM PEDIATROM.



CHORÉ DIEŤA POTREBUJE POKOJ A STAROSTLIVOSŤ.



CHRÁŇME ZDRAVIE OSTATNÝCH DETÍ AJ DOSPELÝCH.



ĎAKUJEME ZA OHĽADUPLNOSŤ A SPOLUPRÁCU!